

サブリーナフロアブル (第 21694 号)

2023 年 3 月 17 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	BT を含む農薬の総使用回数
野菜類 (はくさい、 えごま(葉) を除く)	コガ	1000 倍～ 1500 倍	100～300 L/10a	発生初期 収穫前日 まで	—	散布	—
	アムシ ヨウムシ	1000 倍					
	ハスモンヨウ	500～750 倍					
	オオカバコガ	500 倍					
はくさい	コガ	1000 倍～ 1500 倍					
	アムシ ヨウムシ	1000 倍					
えごま(葉)	コガ	1000 倍～ 1500 倍					
	アムシ ヨウムシ ベニフキメカイ	1000 倍					
	ハスモンヨウ	500～750 倍					
	オオカバコガ	500 倍					
えごま(種子)	ベニフキメカイ	1000 倍					
からしな (種子)	アムシ コガ ヨウムシ						
	ハスモンヨウ		500～750 倍				
豆類 (種 実)	ヨウムシ	1000 倍					
	ハスモンヨウ	500～750 倍					
いも類	オオカバコガ	500 倍					
雑穀類 (ひえを除く)	アワメカイ	1000 倍	200～700 L/10a	発生初期 摘採 7 日 前まで	—	—	
ひえ	アワメカイ イネヨウ						
飼料用とう もろこし	アワメカイ						
食用ほおの き (葉)	マイマイカイ						
食用さくら (葉)、食 用さくら (花)	ケムシ類						
茶	チャノコカクモンハマキ チャハマキ チャノホコガ	200～400 L/10a					
樹木類	ケムシ類	200～700 L/10a					