

7. 適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法
稲	いもち病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ イネドロオイムシ イネミズゾウムシ コブノメイガ	1kg/10a	移植時	1 回	側条施用
稲 (箱育苗)	いもち病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ コブノメイガ	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約 5L) 1 箱当り 50g	緑化期～ 移植当日		
	白葉枯病 もみ枯細菌病 内穎褐変病 イネドロオイムシ イネミズゾウムシ フタオビコヤガ ニカメイチュウ イネツトムシ		移植 3 日前 ～移植当日		
	いもち病 白葉枯病 もみ枯細菌病 内穎褐変病 ウンカ類 ツマグロヨコバイ コブノメイガ イネドロオイムシ イネミズゾウムシ フタオビコヤガ ニカメイチュウ イネツトムシ	高密度に は種する場合は 1kg/10a (育苗箱 (30×60×3cm、使 用土壌約 5L) 1 箱 当り 50～100g)		育苗箱の苗 の上から均 一に散布す る。	

クロラントラニリプロール を含む農薬の総使用回数	ピメトロジンを含む農薬の 総使用回数	プロベナゾールを含む農薬の 総使用回数
1 回	3 回以内 (移植時までの処理は 1 回 以内、本田では 2 回以内)	2 回以内 (移植時までの処理は 1 回以内)

