

アグレプト水和剤 (第 5655 号)

2023 年 3 月 17 日現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ストレプトマイシンを含む農薬の総使用回数
りんご	枝枯細菌病	2000 倍	収穫 60 日前まで	3 回以内	散布	3 回以内
なし			収穫 75 日前まで			
もも	せん孔細菌病	1000～2000 倍	収穫 60 日前まで	2 回以内		2 回以内
すもも	黒斑病 かいよう病	1000 倍	収穫 30 日前まで			
うめ	かいよう病	1000～2000 倍	収穫 90 日前まで	4 回以内		4 回以内 (樹幹注入は 1 回以内)
杓ヾルツ		1000 倍				
さるなし	花腐細菌病		開花前	2 回以内		2 回以内
キャベツ	黒腐病	2000 倍				
はくさい	軟腐病	1000～2000 倍	収穫 14 日前まで	3 回以内		3 回以内
レタス	腐敗病	2000 倍		2 回以内		2 回以内
こんにゃく		1000～2000 倍	収穫 30 日前まで	6 回以内		6 回以内 (種いもへの処理 は 1 回以内)
たまねぎ	軟腐病	1000 倍	収穫 7 日前まで	5 回以内		5 回以内 (種いもへの処理 は 1 回以内)
ばれいしょ	疫病	1000～1500 倍				
	軟腐病	1000 倍	植付前	1 回		5～10 秒間 種いも浸漬
そうか病 黒あし病	60～100 倍					
たばこ	立枯病	1000 倍	収穫 3 日前まで	2 回以内	散布又は 株元灌注	2 回以内